

Etter høsting - rydding av felt

Høstingen er nå ferdig, og rydding av felt står på tur. Etter høsting fjernes gamle skuddene og tynnes de nye. I økologiske felt er det best å gjøre det rett etter høsting for å få luftigere hekker.

Ved fjerning av gamle skudd er det viktig å skjære disse lengst ned mot jorda som mulig. På denne måte en fjerne mulige overvintringssteder for både sopp og insekter. Når det gjelder årets skudd fjern små skudd og tynneste og tykkeste av nye skudd og det bør stå ca. 4-6 skudd per plantehull. Tykkeste skudd er vanligvis mer smittet med skuddsyke og gråskimmel og derfor bør fjernes. Rust er synlig i alle felt.

Ved utskjæring sjekk felten for bringebærbarkgallmygg (rødoransje larver i barken) og bringebærgallmygg (oransje larver i galler) og fjern de skuddene som har disse skadedyr på skuddene.

Skadedyr

Sjekk også feltene for spinnmidd og bladmidd. Det er mye bladmidd å se i enkelte felt. Her må en regne med to olje såpe behandling i slutten av oktober.

Sopp

Når det gjelder sopp, har Nordox effekt mot flere soppsykdommer og bør brukes etter behov. Nordox kan brukes etter utskjæring, før regn. Bruk 100g per daa. Nordox brukes for å redusere både rust og Agrobacterium smitte. Væskeforbruk mellom 20-35l per 100 m rad.

Bladprøver etter høsting

Vi oppfordrer alle til å ta bladprøver etter avsluttet høsting. Med prøvene fra i fjor en kan se hvilke tiltak fungerte i år og hvordan næringsforsyningen er i felt. Enkelte bladgjødslingsmidler kan tilføres sammen med Nordox allerede nå på høsten hvis det er påvist mangel.

Kontaktpersonar for dei ulike kulturane:

Økologisk frukt:

Gaute Myren, tlf. 905 07 087
(gaute.myren@nlr.no)

Økologisk jordbær:

Jan Karstein Henriksen, tlf. 905 90 032
(jkh@nlr.no)

Økologisk bringebær:

Stanislav Strbac, tlf. 975 43 560
(stanislav.strbac@nlr.no)

Økologisk ribes:

Jørn Haslestad, tlf. 977 23 458
(jorn.haslestad@nlr.no)



